



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 46
1296 Šentvid pri Stični
Tel.: 01 78 87 802
E-pošta: info@osferdavesela.si

**PROTOKOL PROSTOVOLJNEGA SAMOTESTIRANJA NA
SARS-COV-2
UČENCEV OSNOVNE ŠOLE FERDA VESELA
ŠENTVID PRI STIČNI**

maj 2021

Kazalo vsebine

1. UVOD	3
2. IZHODIŠČA	3
3. DISTRIBUCIJA TESTOV.....	3
4. IZVEDBA.....	4
5. REZULTATI SAMOTESTIRANJA	4

1. UVOD

Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev v presimptomantskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

2. IZHODIŠČA

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v šoli za učence 3. triade osnovne šole (v nadaljevanju: učence) na domu.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja enkrat tedensko na domu.

Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 5 testov na mesec.

Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli covid-19 in tisti, ki so preboleli covid-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

3. DISTRIBUCIJA TESTOV

Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovi ustrezno označevanje v primerih prepakiranja v skladu z Odločbo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) za odobritev uporabe hitrih testov za samo-testiranje učencev na okužbo z novim koronavirusom, št. 314-3/2015/15, z dne 14. 5. 2021.

Distribucijo testov za izvajanje prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 zagotovi Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) v regijskih izpostavah v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Teste za izvedbo prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 prevzamejo ravnatelj šole oziroma oseba, ki jo za to pooblasti ravnateljica, v regijskih izpostavah URSZR.

Neposredno distribucijo hitrih antigenskih testov učencem, glede na izkazan interes, zagotovijo osebe, ki jih za to pooblasti ravnateljica.

V skladu z odločbo JAZMP šola vodi evidenco o količini testov in času dajanja v uporabo.

4. IZVEDBA

Prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit za vzorčenje v nosu, proizvajalca JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. V primeru pozitivnega hitrega antigeneskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 doma je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavijo se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne odpira.

Ravnateljica šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnateljica pred začetkom samotestiranja na SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom III. točke tega protokola razdeli teste učencem, ki jih zagotovi Ministrstvo za zdravje.

5. REZULTATI SAMOTESTIRANJA

V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri prostovoljnem samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.

V primeru pozitivnega rezultata testiranja izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši.

Učenec na izvid PCR testiranja počaka doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnateljico šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnateljica in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.

Ravnateljica ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu), nato opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca in druge ukrepe potrebne za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom.

Ravnateljica oziroma oseba, ki jo zato pooblasti ravnateljica obvesti prepoznane kontakte učenca in spremlja epidemiološko situacijo v osnovni šoli.

V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

Šentvid pri Stični, 24. 5. 2021

Angelca Mohorič, ravnateljica


PRILOGA:

- Navodila za samo-testiranje v šestih korakih

NAVODILA ZA SAMOTESTIRANJE



V 6 KORAKIH



BRIS ZA ENKRATNO UPORABO

PLASTENKA Z EKSTRAKCIJSKIM PUFIROM

POKROVEČEK ZA EPURVETO

EPURVETA

TESTNA PLOŠČICA

Za dodatne informacije se lahko obrneš na telefonsko številko Ministrstva za zdravje: **01/478 68 48**, vsak delavnik med 8:30 in 15:30

NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

PREDEN SE BOŠ SAMOTESTIRAL, SI TEMELJITO UMIJ ROKE IN OČISTI POVRŠINO MIZE. PRIBOR PO UPORABI ZAPRI V PLASTIČNO VREČKO. PO TREH DNEH JO ODVRZI MED MEŠANE ODPADKE.

1

Pripravi celoten komplet

- epruveto,
- pokrovček za epruveto,
- malo plastenko z ekstrakcijskim puфом,
- bris za enkratno uporabo in testno ploščico.

Testno ploščico izvleči iz embalaže in jo položi na ravno površino.

4

Vstavi bris v epruveto z ekstrakcijskim puфом in z njim 20 sekund mešaj. Zavrti ga vsaj 5 krat.

2

Odstrani pokrovček na plastični in ekstrakcijski pufer prelij v epruveto

3

V eni roki drži epruveto, z drugo roko si očvrtni bris.

- Bris potisni približno 2,5 cm globoko v nosnico.
- Z brisom 5 krat zadreži in nežno podrgni po sluznici.
- Enako ponovi v drugi nosnici.

5

Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor. Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici.

Počakaj 15 minut

Rezultat je tu:

6

NEGATIVEN REZULTAT?

LAJKO SE VINEŠ V ŠOLO. SE NAPREJ UPORŠTEVAJ UKREPE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI

POZITIVEN REZULTAT?

POTREBA JE SAMOZLAŽJA. STARIŠ NAJ TE PRI TVOJEM ZDRAVNIKU NAROČILO NA PCR TESTIRANJE